

40 نمونه سوال آزمون ارشد داخلی جراحی از دوره های گذشته

1 - نظریه اخلاقی پیامد محور کدام است؟

الف) ظاهرگرایی (ب) سودگرایی (ج) مستقل از غایت (د) وظیفه گرایی

2- از عوارض بالقوه و مشکلات مهم بیمار مبتلا به لوکمی حاد، مبتنی بر تشخیص های پرستاری NANDA کدام است؟

الف) خطر عفونت و خونریزی

ب) آسیب تمامیت مخاطی دهان

ج) درد حاد و بی قراری

د) خستگی و عدم تحمل فعالیت

3- فرآورده خونی که در شرایط از دست دادن بیش از 22٪ حجم خون استفاده می شود کدام است؟

الف) پلاکت

ب) خون کامل

ج) پلاسما

د) آلبومین

4- در آمپوتاسیون اندام تحتانی به منظور پیشگیری از تغییر شکل ماندگار در عضو باقیمانده، توصیه مناسب کدام است؟

الف) عدم قرارگیری طولانی مدت در وضعیت فلکسیون

ب) تشویق بیمار به ایستادن و تحمل وزن هر چه سریع تر

ج) انجام تمرینات تغییر پوزیشن از نشسته به ایستاده و بالعکس

د) افزایش تدریجی فعالیت ها برای پیشگیری از خستگی

5- آقای 22 ساله با تشخیص بیماری ایسکمیک در بخش قلب بستری و تحت درمان با وارفارین می باشد، پرستار در کنترل عوارض انعقادی، کدامیک از نتایج آزمایش خون وی را بیشتر مورد توجه قرار می می دهد؟

الف) هماتوکریت

ب) زمان پروترومبین

ج) زمان نسبی ترومبو پلاستین

د) تعداد پلاکت خون

6- برای کنترل درد بیمار مبتلا به پریکاردیت، مورد صحیح کدام است؟

الف) تشویق به تنفس عمیق

ب) انجام سرفه موثر

ج) نشستن و خم شدن به جلو

د) استفاده از نیترو گلیسرین

7- مهم ترین تشخیص ها و مداخلات پرستاری در بیمار مبتلا به میاستنی گراو کدام است؟

الف) لرزش شدید اندام ها

ب) سفتی عضلات اندام ها

ج) ضعف و خستگی عضلات

د) کندی حرکتی و عدم تعادل

8- وضعیت مناسب بیمار پس از عمل جراحی **Infratentorial Craniotomy** کدام است؟

الف) خوابیده به پشت

ب) خوابیده به شکم

(ج) نیمه نشسته

(د) خوابیده به پهلو

9- بیمار 40 ساله با سوختگی درجه دو در ناحیه پشت و شکم، 48 ساعت پس از آسیب، دچار تب 38.5 سانتی گراد و افزایش اگزودای زردرنگ شده است. اقدام اولیه مشترک پزشک و پرستار کدام است؟

(الف) تعویض پانسمان هر 72 ساعت

(ب) کشت زخم و شروع آنتی بیوتیک

(ج) محدود کردن مایعات وریدی

(د) تجویز استامینوفن کدئین

10 - در بیمار 30 ساله با کاهش سطح هوشیاری $GCS=6$ ، مردمک سوزنی و تعداد تنفس 6 بار در دقیقه با احتمال مصرف مرفین، اولین اقدام پرستار در مشارکت با پزشک اورژانس کدام است؟

(الف) تجویز نالوکسان

(ب) شروع آتروپین تراپی

(ج) تجویز گلوکز 50٪

(د) تجویز فلومازنیل

11- پرستار به بیمار دارای کیسه استومی، نحوه صحیح تعویض کیسه استومی را آموزش می دهد، مناسب ترین روش آموزش کدام است؟

(الف) سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ

(ب) نمایش و تمرین نحوه تعویض

(ج) نمایش فیلم آموزشی

(د) تقویت مثبت و پیگیری

12- در تشخیص پرستاری "اضطراب در ارتباط با تهدید مرگ ثانویه به تشخیص سرطان" پیامد مورد انتظار در برنامه مراقبتی کدام است؟

- الف) بیمار احساس اضطراب خود را به صورت کلامی بیان می کند.
- ب) بیمار درمورد پیش آگهی بیماری خود سوالی نمی پرسد.
- ج) بیمار در مورد بیماری خود راغب به کسب اطلاعات جدید نیست.
- د) بیمار از گفتگو با اعضاء خانواده در مورد بیماری خود اجتناب می کند.

13- در مورد تشخیص پرستاری "خطر اختلال در تمامیت پوستی در ارتباط با واکنش به پرتو درمانی" صحیح ترین

مداخله پرستاری کدام است؟

- الف) عدم استفاده از لوسیون، پودر و صابون در ناحیه تحت پرتودرمانی
- ب) بکار بردن لوسیون ها حاوی آلومینیوم جهت محافظت ناحیه پرتو درمانی
- ج) قرار دادن ناحیه پرتو درمانی در معرض هوای آزاد و نور خورشید
- د) شستشوی مکرر ناحیه پرتو درمانی با شوینده های قلیایی و آب ولرم

14- در بررسی وضعیت سلامت مددجو، تمرکز جمع آوری داده های ذهنی Subjective Data کدام است؟

- الف) انجام معاینه فیزیکی
- ب) گرفتن شرح حال از بیمار
- ج) اخذ داده های پاراکلینیکی
- د) داده های ثبت شده در پرونده

15- در مسمومیت شیمیایی با گاز سارین، اقدام پرستاری اورژانسی کدام است؟

الف) تجویز آتروپین و پرایدوکسیم

ب) شستشوی پوست با آب سرد

ج) قرار دادن بیمار در اتاق ایزوله

د) تجویز داروهای ضد اضطراب

16- علایم هشدار دهنده دهیدراتاسیون در افراد مبتلا به تهوع و استفراغ کدام است؟

الف) احساس گیجی و ضعف

ب) پوست گرم و خشک

ج) سرفه و تنگی نفس

د) کاهش سرعت پر شدن مویرگی

17- بیماری به دلیل درد ناشی از سرطان تحت درمان با متادون قرار گرفته است. کدامیک از موارد

زیر در مورد درمان با این دارو صحیح است؟

الف) عوارض سایر مخدرها در استفاده از این دارو کمتر است.

ب) دارای نیمه عمر طولانی مدت، بطور متوسط ۷۵ ساعت است.

ج) با داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، تداخل دارویی دارد.

د) در حین درمان باید آنزیم های کبدی هر یک ماه بررسی شود.

18- در پرستاری از بیمار مبتلا به کم کاری تیروئید کدامیک از موارد زیر در نظر گرفته می شود؟

الف) به دلیل طولانی تر شدن تاثیر داروهای مسکن، باید عوارض آنها بررسی شود.

ب) بیمار باید لباس سبک تر و کمتری بپوشد تا بتواند هوای گرم را بهتر تحمل کند.

ج) از وارد کردن محرک های مختلف کلامی و غیر کلامی به بیمار خودداری شود.

د) بیمار باید آموزش ببیند که از مصرف داروهای مسهل پرهیز نماید.

19- انجام ورزش یکی از اصول درمان موفق در کنترل بیماری دیابت نوع 2 است. توصیه ضروری به این بیماران کدام است؟

الف) انجام فعالیت ورزشی حداقل یک بار در هفته

ب) انجام ورزش روزانه در ساعت ها و مدت های متفاوت

ج) اجتناب از فعالیت ورزشی در هوای بسیار سرد یا گرم

د) اجتناب از مصرف آب در حین انجام فعالیت ورزشی

20- در بررسی مددجو جهت استفاده از مدل های توانبخشی مهم ترین بررسی پرستار کدام است؟

الف) موقعیت اجتماعی

ب) وضعیت ذهنی

ج) ظرفیت عملکردی

د) وضعیت حسی

21- در مددجوی 85 ساله جهت پیشگیری از خطر فشارخون ارتوستاتیک، توصیه پرستاری کدام است؟

الف) تغییر پوزیشن آرام از حالت ایستاده به حالت نشسته

ب) استفاده از دوش آب گرم به منظور افزایش خونرسانی عروق محیطی

ج) اجتناب از مانور والسالوا حین زور زدن هنگام اجابت مزاج

د) استفاده از رژیم غذایی حجیم و کامل به منظور افزایش استقامت عروق

22- پرستار باید کدامیک از عوارض زیر را بدنبال اعمال جراحی معده بررسی کند؟

الف) سندرم دامپینگ

ب) کمبود ویتامین B12

(ج) سندرم روده تحریک پذیر

(د) اختلالات انعقادی

23- در مورد انقباضات زودرس بطنی PVCs مورد صحیح کدام است؟

(الف) همواره نشانه ای خطرناک قلمداد شده و نیاز به درمان فوری دارد.

(ب) رخدادی متداول هست که با افزایش سن نیز بیشتر دیده می شود.

(ج) آمیودارون و بتابلوکر برای کنترل آن به کار برده می شود.

(د) موج P هیچگاه در این آریتمی بعد از QRS دیده نمی شود.

24- در مورد مداخلات پرستاری حین انجام تونومتری چشمی؛ کدام مورد صحیح است؟

(الف) فشردن پلک ها

(ب) حبس کردن نفس

(ج) اجتناب از والسالوا

(د) انجام تنفس لب غنچه ای

25- قضاوت بالینی در مورد واکنش های افراد خانواده و جامعه نسبت به مشکلات سلامتی که

مستقلاً توسط مداخلات پرستاری قابل مدیریت هست چه نام دارد؟

(الف) بررسی وضعیت بیمار

(ب) فرآیند پرستاری

(ج) تشخیص پرستاری

(د) ارزشیابی مداخلات

26- درسکته مغزی هموراژیک پایش دقیق مستمر علایم حیاتی و تغییرات عصبی ضروری می باشد.

اولین علامت و تغییری که باید پرستار به آن توجه کند چیست؟

الف) درد منتشر بدن

ب) تغییر در سطح هوشیاری

ج تشنج های تونیک و کلونیک

د تنفس کوتاه و سطحی

27- به عنوان پرستار حین اندازه گیری فشارخون متوجه اسپاسم انگشتان و مچ دست بیمار می شوید چه علامتی هست و چه باید انجام دهید؟

الف) علامت شوستک Chvostek Sign و نشانه هیپرکلسیمی نیاز به کار خاصی نیست

ب) علامت ترسو Trousseau Sign و نشانه هیپوکلسیمی باید گزارش و الکترولیت ها کنترل شود.

ج علامت شوستک Chrostek Sign و نشانه هیپرکالمی باید گزارش و الکترولیت ها کنترل شود.

د) علامت ترسو Trousseau Sign و نشانه هیپوکالمی نیاز به کار خاصی نیست

28- پرستار در حال مراقبت از بیمار مبتلا به عفونت پیشرفته است که در معرض خطر شوک قرار دارد. مشاهده کدام علامت زیر مهم می باشد؟

الف) افزایش فشار سیستولیک

ب افزایش متوسط فشار شریانی

ج تنفس سریع و سطحی

د) برادیکاردی

29- در مراقبت از بیمار دریافت کننده رادیوتراپی خارجی برای تومور بدخیم در ناحیه گردن پرستار در آموزش به بیمار باید در مورد کدام عارضه احتمالی با بیمار صحبت کند؟

الف) اختلال در تغذیه

ید) تغییرات شناختی

چ) اسهال و استفراغ

(د) ریزش مو

30- پرستار بیماری را برای جراحی آماده می کند که خیلی مضطرب است و واقعاً نمی داند که چه

عمل جراحی و چگونه انجام می شود مناسب ترین اقدام پرستار کدام مورد ذیل می باشد؟

الف) از بیمار رضایت عمل را اخذ نموده در پرونده قرار دهد.

ب) از پزشک معالج بخواهد تا روش جراحی را برای بیمار توضیح دهد.

ج) چگونگی جراحی را دقیق و روشن برای بیمار و خانواده توضیح دهد.

د) پمفلت آموزشی روش و چگونگی جراحی را در اختیار بیمار قرار دهد.

31- اولین بررسی و توجه پرستار، ریکاوری بعد از عمل موفق اسپلنکتومی کدام است؟

الف) ریتم و تعداد ضربان قلب

ب) چک کردن محل عمل

ج) درجه حرارت بیمار

د باز بودن راه هوایی

32- برای بیمار مبتلا به بیماری انسدادی مزمن ریه COPD کدام یافته زیر نشان دهنده اکسیژن

درمانی موثر می باشد؟

الف) افزایش تعداد تنفس

ب سیانوز مرکزی

ج) بهبود سطح هوشیاری

د کاهش اشباع اکسیژن شریانی

33- در مسمومیت با دیژیتال کدام نکات مراقبتی زیر باید توجه شود؟

الف) مصرف توام با الداکتون خطر مسمومیت با دیژیتال را افزایش می دهد.

ب) بی اشتهایی، تهوع و استفراغ از اولین علائم مسمومیت دیژیتال است.

ج) قبل از دادن شوک قلبی دوز دیگوکسین را افزایش می دهند.

د) درمان مسمومیت دیژیتال از لیدوکائین تزریقی استفاده می شود.

34- بیمار دچار گرفتگی عضلات گزگز و بی حسی اندام ها می باشد. گازهای خون شریانی:

pH:7.6, PaO₂:120mmHG PaCO₂:31mmHg, HCO₃:25mmol/lit.

را نشان می دهد بیمار در کدامیک از شرایط زیر می باشد؟

الف) الکلوز تنفسی جبران نشده

ب) اسیدوز تنفسی تا حدی جبران شده

ج) الکلوز متابولیک جبران نشده

د) آلکلوز متابولیک تا حدی جبران شده

35- دوبوتامین (دویو ترکس) که برون ده قلبی را بهبود میدهد در چه شرایطی کاربرد ندارد؟

الف) شوک سپتیک

ب) نارسایی احتقانی قلبی

ج) اریتمی

د) احتقان ریوی

36- کدام اثر مسدود کننده های کانال کلسیم باعث کاهش فشارخون می شود؟

الف) افزایش برونده قلبی

ب) کاهش مقاومت عروق محیطی

ج) کاهش جریان خون کلیوی

د) هجوم کلسیم به عضله قلب

37- از بیماری که دوره حاد درمان انفارکتوس میوکارد را گذرانده و اکنون در مرحله بازتوانی فعال می باشد مراقبت می کنید در چه شرایطی توصیه می کنید که بیمار فعالیت خودش را تعدیل و کاهش دهد؟

الف) وقتی درد قفسه سینه طپش و تنگی نفس را تجربه کند.

ب) زمانی که افزایش تعداد ضربات قلب طی فعالیت را تجربه کند.

ج) اشباع اکسیژن شریانی زیر ۹۷ درصد قرار گیرد.

د) تعداد تنفس بیمار بیش از ۲۰ تا ۳۰ بار در دقیقه افزایش یابد.

38- برای بیماری داروی ضد فشارخون بالا تجویز شده پرستار بعد از بررسی و تحلیل تشخیص پرستاری تهدید آسیب حفظ سلامت مرتبط با عدم پیروی از رژیم درمانی شناسایی کرده است پرستار در برنامه ریزی مراقبتی این بیمار مراقبتی چه توصیه ای را تعیین می کند؟ الف) داروها طبق تجویز مصرف و هرگونه عوارض ناخواسته را گزارش دهد.

ب) هر هفته یک بار برای کنترل فشارخون به درمانگاه مراجعه کنند.

ج) علائم و نشانه افزایش اورژانسی فشارخون را نا دیده بگیرد.

د) عوامل خطر ساز قابل کنترل و تعدیل فشارخون بالا را توضیح دهد.

39- پرستار در برنامه ریزی آموزش به بیمار مبتلا به آنمی فقر آهن که مکملهای آهن مصرف میکند به چه نکته ای توجه می کند؟

الف) مصرف آهن با محصولات لبنی موجب افزایش جذب آهن می شود.

ب) افزایش مصرف ویتامین E موجب افزایش جذب آهن می شود

ج) مصرف مکمل های آهن موجب تیره شدن رنگ مدفوع می شود.

د) محدود کردن مصرف غذاهای با فیبر بالا موجب اسهال می شود.

40- پرستار واکسن MMR را طبق برنامه مدون واکسیناسیون برای کودک تزریق کرد این واکسیناسیون کدام نوع ایمنی زیر را در کودک ایجاد می کند؟

الف) ایمنی طبیعی

ب) ایمنی اکتسابی فعال

ج) ایمنی سلولی

د) ایمنی اکتسابی غیر فعال

پاسخنامه سوالات داخلی جراحی پرستاری

شماره سوال	پاسخ صحیح
1	ب
2	الف
3	ب
4	الف
5	ب
6	ج
7	ج
8	د
9	ب
10	الف
11	ب
12	الف
13	الف
14	ب
15	الف
16	الف و د
17	ب
18	الف
19	ج
20	ج
21	ج
22	الف
23	ب
24	ج
25	ج
26	ب
27	ب

ج	28
الف	29
ب	30
د	31
ج	32
ب	33
الف	34
ج	35
ب	36
الف	37
الف	38
ج	39
ب	40